VADEMÉCUM

CAT FRIENDLY

John Martin®



Somos líderes en el desarrollo de medicamentos con los **principales activos**, en **formas farmacéuticas palatables** y de **fácil administración** para atender las necesidades específicas de esta especie.

+Omega®
John Martin



NUEVO

1g de producto =
36 mg EPA y 24 mg DHA

CON CUCHARA DOSIFICADORA

PASTA PALATABLE


80 y 200 g

COMPOSICIÓN: Aceite de pescado de aguas profundas* 200 mg; Vitamina E acetato** 10 mg; Excipientes c.s.p. 1 g.
*1 g de pasta aporta 60 mg de ácidos ácidos grasos omega-3 (EPA 36 mg + DHA 24 mg).
** 10 mg de Vitamina E acetato corresponde a 10 Unidades de Vitamina E.
EPA: ácido eicosapentaenoico
DHA: ácido docosahexaenoico

INDICACIONES: +Omega JOHN MARTIN se indica, por su alto contenido de AGE, como suplemento de apoyo para distintas patologías, ayudando a mejorar los tiempos de convalecencia e incrementando el bienestar general del paciente.
Colabora en el mantenimiento de la barrera cutánea, lo cual favorece la piel y pelaje. Puede acompañar el tratamiento de la DAPP (dermatitis alérgica por pulgas), seborrea, dermatitis miliar, prurito e hiperqueratosis.
Coadyuvante en las terapias cardiacas de arritmias e insuficiencia cardíaca y procesos de caquexia. Interviene en el metabolismo del colesterol y los triglicéridos.
En el enfermo renal crónico se ve afectada la perfusión renal, la acción vasodilatadora de los EPA ayuda en disminuir el daño de la nefrona, al mejorar el flujo sanguíneo renal.
Por la acción neuroprotectora de los ácidos grasos frente a enfermedades neurodegenerativas, colabora en preservar la actividad sensorial y mental en los gerontes.
En el abordaje integral de la osteoartritis y la artrosis, es útil como suplemento ya que ayuda a modular las reacciones inflamatorias y oxidativas.
Colabora en el alivio de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Como suplemento nutricional en el paciente oncológico, en la etapa de cuidados paliativos y colaborando a prevenir caquexia. Mejora el estado de la piel y mucosas en pacientes sometidos a radiación.
El aporte prenatal de omega-3 favorece el desarrollo cerebral y de la función visual de los cachorros en formación. Además, suplementando a la madre durante el período de lactancia, resultará en una mejora en el aprendizaje posterior, memoria y socialización de los cachorros.
Además, puede utilizarse como suplemento en animales obesos y como apoyo para el correcto funcionamiento del sistema inmune.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
Se administra por vía oral una vez al día solo o en conjunto con el alimento. A fin de una correcta administración se provee una cuchara plástica dosificadora.
Como suplemento nutricional complementario a la terapia de la enfermedad renal, cardiológica, dermatológica, oncológica, síndrome de disfunción cognitiva, etc. La cantidad a administrar podrá modificarse a criterio del veterinario responsable en función de las necesidades.

Gatos: cada 5 kg de peso administrar entre 1,5 y 6 g de producto/día.
Aporta entre 90 y 360 mg de Omega 3 (EPA + DHA).
Cachorros (a partir de los 3 meses) para colaborar en su desarrollo cognitivo y aprendizaje puede administrarse en una dosis de hasta 3 g totales por día, dependiendo del tamaño del cachorro solo o en conjunto con el alimento.
Hembras en período de gestación o lactancia hasta 3 g / 10 kg por día solo o en conjunto con el alimento.
El tiempo mínimo sugerido de administración es de 30-60 días y quedará a criterio del veterinario responsable dependiendo del cuadro clínico por el cual se suplementa, del caso particular y de la edad del animal.



PRESENTACIÓN:
Estuche conteniendo pomo 80 y 200 g y una cuchara dosificadora.

Senioline® CATS
John Martin



NUEVO

COMPRIMIDOS SABORIZADOS

60 mini comprimidos **birranurados**

COMPOSICIÓN: Condroitín, sulfato sódico 6,50 mg; Glucosamina clorhidrato 9,00 mg; Vitamina B1, clorhidrato (Tiamina HCl) 0,40 mg; Vitamina B2 5´- fosfato sódico (Riboflavina) 0,10 mg; Vitamina B6 clorhidrato (Piridoxina HCl) 0,40 mg; Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,001 mg; Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 1,25 mg; Vitamina E acetato (dl-α-tocoferil acetato) 2,00 mg; Coenzima Q_{10} 0,30 mg; Ácido fólico 0,0025 mg; L-Fenilalanina 1,50 mg; DL-Metionina 0,50 mg; L-lisina, clorhidrato 0,50 mg; Colina, bitartrato 1,25 mg; Zinc sulfato, heptahidrato (equivalente a 0,0341 mg de Zn) 0,15 mg; Selenito de sodio (equivalente a 0,227 µg de Se) 0,0005 mg; Cobre sulfato, pentahidrato (equivalente a 0,0051 mg de Cu) 0,02 mg; Férrico amónico citrato (equivalente a 0,17054 mg de Fe) 0,80 mg; Magnesio sulfato, heptahidrato (equivalente a 0,0987 mg de Mg) 1,00 mg; Potasio cloruro 0,12 mg; Potasio ioduro 0,02 mg; Extracto seco de arándano 0,75 mg; Extracto seco de *Ginkgo biloba* a 1,00 mg; Fostatidilserina 0,30 mg; Aceite de pescado 6,00 mg; Pared celular de levadura 2,00 mg; Excipientes c.s.p. 140,00 mg.
*Vitamina E acetato 1 mg corresponden a 1 UI de Vitamina E

INDICACIONES: Complemento dietario destinado al cuidado de la salud integral de gatos adultos maduros y senior.

Sistema Nervioso Central (SNC): Por su aporte de nutrientes (fosfatidilserina y fosfolípidos) y un pool de antioxidantes (vitamina E, Se, Cu, Coenzima Q_{10}, omega-3, extracto de arándano, *Ginkgo biloba*), ayuda a prevenir la degeneración neuronal y sus síntomas. El aporte de fenilalanina colabora en la formación de neurotransmisores para la mejora de las facultades cognitivas. Las vitaminas del grupo B (B1, B6 y B12) cumplen una función antineurítica y aportan protección en neuropatías periféricas.

Bienestar Articular: Promueve a través de la glucosamina y condroitín el bienestar articular y en conjunto con el omega-3 colaboran para aliviar la inflamación, dolor y rigidez articular, mejorando el movimiento y disminuyendo el dolor.

Sistema Cardiovascular: Colabora en el soporte del paciente cardíaco. Los ácidos grasos omega-3 favorecen la disminución del colesterol y los triglicéridos. El aporte de vitaminas y aminoácidos resulta un adecuado soporte nutricional para la caquexia que suele asociarse en estos pacientes.

Sistema Urinario: Favorece un adecuado funcionamiento renal y urinario, reforzando vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que pueden perderse en la enfermedad renal crónica. El extracto de arándano aporta acción antioxidante y propiedades antisépticas naturales.

Sistema Tegumentario: Promueve el mantenimiento de una piel y pelaje saludables a través del aporte de zinc, metionina y ácidos grasos omega-3.

Sistema Digestivo: Actúa en la regulación de la microbiota intestinal aportando MOS (manano oligosacáridos) pared de levadura, prebióticos que son sustrato para su normal crecimiento y función.

Sistema Linfohematopoyético: Aporta factores necesarios para una correcta hematopoyesis y función inmunológica (vitamina B12, vitamina C, ácido fólico, hierro y lisina).

Sistema Hepatobiliar: Aporta aminoácidos como lisina, metionina y colina; nutrientes esenciales para el metabolismo y la función hepática.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Se recomienda en gatos, 2 comprimidos cada 5 kilos por día. La administración y duración del tratamiento puede variar según el criterio del Profesional Veterinario o de acuerdo a la necesidad del paciente.
Se sugiere 60 días mínimo, pudiendo prolongarse la suplementación por largos periodos de tiempo o de por vida.

PRESENTACIÓN: Estuches conteniendo 3 blisters x 20 comprimidos.

PRODUCTOS **CAT FRIENDLY**

Colotrin +HA CATS



PASTA PALATABLE

CON **CUCHARA DOSIFICADORA**

80 g

COMPOSICIÓN
Glucosamina, clorhidrato 3000 mg; Condroitín, sulfato sódico 2000 mg; Metilsulfonilmetano 5000 mg; Ácido hialurónico, sal sódica 150 mg; Magnesio cloruro, hexahidrato (equivalente a 35 mg de Mg) 300 mg; Zinc sulfato, heptahidrato (equivalente a 159 mg de Zn) 700 mg; Aceite de hígado de bacalao 3000 mg. Excipientes c.s.p. 100 g.

INDICACIONES
Condroprotector. Mantiene la integridad anatómica y funcional del cartílago. Previene y retrasa los signos de degeneración articular en animales con osteoartritis de cualquier origen y gerontes.
El ácido hialurónico contribuye al mantenimiento del líquido sinovial necesario para mejorar la movilidad articular. El MSM posee acción antiinflamatoria, antioxidante y provee de sulfatos para el mantenimiento y reparación de los tejidos articulares. El magnesio y el zinc ayudan al fortalecimiento de las articulaciones. Indicado para el tratamiento de la osteoartritis primaria o secundaria y otros procesos inflamatorios de las articulaciones como la sinovitis, artritis no infecciosa, condropatías, hidrartrosis, enfermedad articular degenerativa y la tendinitis.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar una vez por día. La duración del tratamiento inicial no debe ser inferior a 45-60 días. Posteriormente, según criterio del Profesional Veterinario actuante, puede ser administrado para el mantenimiento de la salud articular por períodos prolongados y sin necesidad de interrupción.
1 cuchara dosificadora (2g) / gato / día.

PRESENTACIÓN
Pomo 80 g.

Tónico total CATS



PASTA PALATABLE

80 g

COMPOSICIÓN
Taurina 2000 mg; Biotina 0,2 mg; Vitamina A, palmitato 10000 UI; Vitamina D3 1000 UI; Vitamina B1, Tiamina clorhidrato 22 mg; Vitamina B2, Riboflavina 5'- fosfato sódico 5 mg; Vitamina B3, Nicotinamida 30 mg; Vitamina B12, Cianocobalamina 0,04 mg; Vitamina E, acetato 50 mg; Ácido fólico 2 mg; Magnesio cloruro, hexahidrato 300 mg (equivalente a 35,9 mg de Mg); Zinc sulfato, heptahidrato 25 mg (equivalente a 5,7 mg de Zinc); Aceite de hígado de bacalao 3000 mg. Excipientes c.s.p. 100 g.

INDICACIONES
Estados fisiológicos de mayor demanda:
Pediatría, gestación y lactancia.
Situaciones de estrés o previo a las mismas.
Estados carenciales. Soporte nutricional (dietas caseras o deficientes). Complemento del tratamiento en enfermedades infecciosas.
Refuerzo del sistema inmunológico.
Animales de exposición. Mejora de piel y pelaje.
Vehículo de otros medicamentos.
Refuerzo positivo en maniobras de consultorio.
Animales con paladar selectivo.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Gatos de todas las edades: administrar por vía oral 1g de producto/kg/día. Como medida orientativa, una cucharada de café equivale a 2,5 g.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Pomo 80 g.

Nutripet
John Martin



PASTA PALATABLE

40 y 80 g

COMPOSICIÓN
Vitamina A, palmitato 17500 UI (equivalente a 9.72 mg); Vitamina D3 1000 UI (equivalente a 25 µg); Vitamina B1, clorhidrato 32 mg; Vitamina B2, 5-fosfato sódico 3,2 mg; Vitamina B3, nicotinamida 32 mg; Vitamina B6 18 mg; Vitamina B12 35 µg; Vitamina E, acetato 135 mg; Ácido fólico 3,2 mg; L-Lisina, clorhidrato 50 mg; Taurina 50 mg; Calcio, carbonato 360 mg (equivalente a 144 mg de Ca); Magnesio cloruro, hexahidrato 4 mg (equivalente a 0,478 mg de Mg); Manganeso cloruro, tetrahidrato 18 mg (equivalente a 5 mg de Mn); Potasio, cloruro 3 mg; Potasio, ioduro 6 mg. Excipientes c.s.p. 100 g. Humedad (máx): 11,5%; Grasas (mín): 35,3%; Proteína (min): 2,3%; Cenizas totales (máx): 6,5%; Fibra cruda (máx): 0,13%; Hidrato de carbono (min): 43,5%. Calorías: 500 kcal.

INDICACIONES
Estados debilitantes: anorexia, caquexia, hiporexia. Animales hospitalizados y/o convalecientes. Neonatología. Recuperación postquirúrgica. Coadyuvante en la recuperación de patologías gastrointestinales. En el ayuno prequirúrgico prolongado para evitar la hipoglucemia.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral. La emulsión alimenticia se prepara en concentración de hasta 40% v/v. Como complemento alimenticio: 6 a 12 gramos equivalentes a 2 cucharaditas de té cada 5 kg de peso. En caso de anorexia total o parcial, o estados debilitantes: 1 o 2 cucharadas de sopa cada 5 kg de peso. La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante. Orientativamente se sugiere un mínimo de 15 días.

PRESENTACIÓN
Pomo 40 g y 80 g.

PRODUCTOS **CAT FRIENDLY**

COMPRIMIDOS **DE FÁCIL ADMINISTRACIÓN**

Meloxivet® gotas
John Martin



GOTAS SABORIZADAS

Meloxivet® 2
John Martin

NUEVO



COMPRIMIDOS SABORIZADOS

10 ml

COMPOSICIÓN
Meloxicam 0,5 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES
Tratamiento del dolor e inflamación aguda o crónica de cualquier origen, especialmente musculoesquelética. Tratamiento del dolor oncológico y dolor postquirúrgico como único tratamiento o como parte de una terapia multimodal junto con otros analgésicos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
Dosis de 0,1 mg/kg/24 horas por 3 a 5 días y luego 0,1 mg totales cada 24-72 horas.
Como guía en la dosificación 0,5 mg =25 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero 10 ml.

10 y 100 comprimidos **birranurados**

COMPOSICIÓN: Meloxicam 2 mg. Excipientes c.s.p. 1 comp.

INDICACIONES: Tratamiento del dolor e inflamación aguda o crónica de cualquier origen, especialmente musculoesquelético. Tratamiento del dolor oncológico y dolor postquirúrgico como único tratamiento o como parte de una terapia multimodal junto con otros analgésicos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Administrar por vía oral.
Felinos: dosis de 0,1 mg/kg/24 horas por 3 a 5 días y luego 0,1 mg totales cada 24-72 horas.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN: Estuche con 10 comprimidos. Estuche hospitalario con 100 comprimidos.

Tramadol®
John Martin
gotas



GOTAS SABORIZADAS

10 ml

COMPOSICIÓN
Tramadol, clorhidrato 100 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES
Tratamiento del dolor moderado a severo.
Tratamiento del dolor agudo y crónico.
Dolor refractario a otros tratamientos.
Dolor somático y/o visceral.
En el dolor postquirúrgico.
Dolor oncológico.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
1-3 mg/kg dos a tres veces por día.
Como guía en la dosificación:
100 mg = 30 gotas = 1ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero 10 ml.

Prednisol
gotas



GOTAS SABORIZADAS

15 ml

COMPOSICIÓN
Prednisolona 10 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES
Antiinflamatorio. Antialérgico. Inmunosupresor.
Terapia de reemplazo corticosteroide.
Asma y bronquitis alérgica.
Desórdenes gastrointestinales.
Dermatitis. Gingivitis, estomatitis y procesos de la cavidad bucofaríngea. Inmunosupresión. Complemento en el tratamiento de neoplasias.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
Las dosis a administrar pueden variar de acuerdo al cuadro a tratar y oscilan entre 1-4 mg/kg/día, equivalentes a 2-8 gotas/kg/día.

Como guía en la dosificación:
10 mg = 20 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero 15 ml.

Ranitidina
John Martin
gotas



GOTAS SABORIZADAS

30 ml

COMPOSICIÓN
Ranitidina, clorhidrato 10 mg; Excipientes c.s.p. 1ml.

INDICACIONES
Indicado para el tratamiento de esofagitis, gastrinoma, gastritis y úlcera gástrica o duodenal. En casos donde se deba disminuir la acidez estomacal.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
2-3,5 mg/kg equivalente a 1-2 ml cada 5 kg.
Administrar cada 12 horas.
Se recomienda iniciar el tratamiento por vía parenteral para luego continuar por vía oral.
Como guía en la dosificación 10 mg = 25 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero 30 ml.

Hepato
John Martin gotas



GOTAS SABORIZADAS

15 ml

COMPOSICIÓN
Acetilmetionina 1500 mg; DL-metionina 1500 mg; Homatropina, metilbromuro 100 mg; Colina, bitartrato 1000 mg; Vitamina B12 1 mg; Extracto fluido de Cynara scolymus 5000 mg; Extracto fluido de Peumus boldus 3000 mg; Extracto fluido de Rhamnus purshiana 2500 mg. Excipientes c.s.p.100 ml.

INDICACIONES
Protector hepático, colagogo y colerético natural.
Tratamiento de hepatopatías de diverso origen: hepatitis, lesiones tóxicas, insuficiencias hepáticas, ictericia, espasmos y éstasis biliar, con constipación intestinal y meteorismo.
Regulación del metabolismo lipídico hepático.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
3 gotas/kg. Dosis máxima: 30 gotas totales. Cuando el peso supere los 10 kg, utilizar siempre la dosis máxima.
Administrar cada 12 horas.
Se puede suministrar diluido con agua o solución azucarada.
Como guía en la dosificación 20 gotas = 1 ml.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero 15 ml.

Ursoliv®



SUSPENSIÓN ORAL SABORIZADA

CON JERINGA BUCAL DOSIFICADORA

75 ml

COMPOSICIÓN:
Ácido ursodesoxicólico 50 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES:
Ursoliv es una suspensión de uso oral saborizada que se indica como tratamiento de patologías hepáticas y biliares inflamatorias **cuando no existe obstrucción biliar.**
Como colerético, cuando existe estasis biliar (colestasis sin obstrucción). En la hepatitis crónica y otras hepatopatías, el ácido ursodesoxicólico puede utilizarse solo o asociado a otras drogas, como antiinflamatorios inmunomoduladores o hepatoprotectores según el protocolo definido para el tratamiento. En la triaditis felina en asociación con otros tratamientos. En el mucocele de la vesícula biliar, con presencia de barro biliar. En la colelitiasis, previene la formación de cálculos en animales con antecedentes de esta patología o con formación de barro biliar recurrente.
Acción litolítica: puede colaborar en la disolución de cálculos pequeños preexistentes, no obstructivos ni calcificados, con un tratamiento lo suficientemente prolongado, de al menos 3 meses.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
La dosis a administrar en gatos es de 10-15 mg/kg/día (0,2-0,3 ml/kg de la suspensión). La dosis total diaria puede administrarse en 1 o 2 tomas, en este último caso separadas por 12 hs. Se recomienda administrar junto con el alimento o a la hora de la alimentación para su mejor acción. La duración del tratamiento quedará a criterio del Profesional Veterinario actuante y guardará relación con el cuadro que se desea tratar.

PRESENTACIÓN:
Frasco 75 ml con jeringa dosificadora.

Felilax® pet



PASTA PALATABLE

40 g

COMPOSICIÓN
Vaselina sólida 25 g; Lecitina 5 g; Ácido benzoico 0,25 g; Aceite de hígado de bacalao 0,25 g; Extracto de malta c.s.p. 100 g.

INDICACIONES
Laxante suave. Lubricante intestinal. Preventivo de la constipación producida por la ingestión de pelos y formación de bolos (tricobezoares).

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
En la constipación y para remoción de tricobezoares: ½-1 cucharada de té (2-5 g totales), 1 a 2 veces por día.
Como preventivo: ¼ -½ cucharada de té (1 a 3 g totales), 2 a 3 veces por semana.
La dosis indicada se podrá administrar al animal colocándola en el dorso de la mano para que la ingiera con el lamido.

PRESENTACIÓN
Pomo 40 g.

Ascaricida

John Martin

gotas



GOTAS SABORIZADAS

15 ml

COMPOSICIÓN
Piperazina, biclorhidrato 20 g; Homatropina, metilbromuro 0,1 g. Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES
Antiparasitario interno para caninos y felinos.
Activo contra nematodes: *Toxocara cati*, *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar por vía oral.
10 gotas/kg o 0,5 ml/kg.
Repetir la dosificación a las 48 horas y a los 15 días posteriores. No se necesita ayuno previo o posterior al tratamiento.
Como guía en la dosificación 200 mg de piperazina, biclorhidrato = 20 gotas = 1 ml.
La duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN
Frasco gotero 15 ml.

PRODUCTOS **CAT FRIENDLY**

COMPRIMIDOS **DE FÁCIL ADMINISTRACIÓN**

block! fipro



1 pipeta

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:
Fipronil 10 g. Agentes de formulación c.s.p.

INDICACIONES
Tratamiento, control y prevención de las ectoparasitosis causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).
El producto puede ser usado con seguridad en hembras gestantes y lactantes, animales enfermos o debilitados.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Uso externo.
Aplicar directamente sobre la piel separando el pelo en 2-3 puntos entre la nuca y la cruz.
block! Fipro gatos: Pipeta de 0,50 ml.
Repetir la aplicación cada 28-30 días.
Administrar exclusivamente en felinos mayores a 8 semanas de edad.

PRESENTACIÓN
Estuches conteniendo 1 pipeta.

block! spino



COMPRIMIDOS SABORIZADOS

1 comprimido

COMPOSICIÓN:
Comprimidos XS
Spinosad 150 mg; Excipientes c.s.p. 1 comp.
Comprimidos S
Spinosad 300 mg; Excipientes c.s.p. 1 comp.
Comprimidos M
Spinosad 600 mg; Excipientes c.s.p. 1 comp.

INDICACIONES:
Indicado para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) en felinos, a partir de las 14 semanas de edad.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
Se dosifica a razón de 50 mg/kg de spinosad en gatos.
Se administra vía oral, preferentemente con el alimento, un comprimido de acuerdo a la siguiente tabla de dosificación.

	RANGO DE PESO EN PERROS	RANGO DE PESO EN GATOS	SPINOSAD	PESO TOTAL DEL COMPRIMIDO
XS	2,5 - 5 kg	2 - 3 kg	150 mg	350 mg
S	5,1 - 10 kg	3,1 - 6 kg	300 mg	700 mg
M	10,1 - 20 kg	6,1 - 12 kg	600 mg	1400 mg

PRESENTACIÓN
Estuche conteniendo 1 comprimido según el rango de peso del animal: XS / S / M.

Flexapet

CONTIENE COLÁGENO TIPO II NO DESNATURALIZADO



COMPRIMIDOS SABORIZADOS

La evolución en salud articular.

30 comprimidos **birranurados**

COMPOSICIÓN:
Colágeno 40 mg enriquecido con colágeno no desnaturalizado (nativo) tipo II; Vitamina E, acetato 10 mg; Magnesio, sulfato 10 mg. Excipientes c.s.p. 1 comp.

INDICACIONES:
El colágeno no desnaturalizado tipo II es el principal componente de la matriz extracelular. Brinda soporte a los glucosaminoglicanos otorgando fuerza y elasticidad a la articulación. En su forma nativa mantiene su estructura tridimensional conservando los epítopos.
A través de su aporte y acción sobre las placas de Peyer, se logra, por un mecanismo inmunomediado, una desensibilización al colágeno endógeno, evitando la degradación del mismo y los mecanismos inflamatorios que esto genera. Actúa como un inmunomodulador articular. Su fórmula se completa con Magnesio que ayuda al fortalecimiento de las articulaciones y Vitamina E con efecto antioxidante para proteger la articulación inflamada de los radicales libres. Flexapet previene la osteoartritis y sus síntomas: dolor, inflamación y pérdida de movilidad, favoreciendo la salud articular.
Su uso está indicado en:
-Animales con aplomos deficientes cuyas articulaciones se ven sometidas a estrés y desgaste anormal.
-Animales con sobrepeso u obesos de cualquier talla y edad.
-En la enfermedad articular degenerativa (EDA) ya declarada, en conjunto con otros antiartrósicos clásicos, es decir como terapia multimodal o como único tratamiento.
-Artropatías de columna, dado que el colágeno tipo II es un componente abundante en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales.
-En la convalecencia postquirúrgica cuando el procedimiento realizado involucre una articulación.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
Administrar por vía oral.
Felinos de todas las edades: 1/4 comprimido por día.
Como recomendación general se sugiere un mínimo de 60 días de utilización, especialmente durante épocas de frío y humedad.
A partir de los 90 días se observa una marcada disminución de dolor, aumento de la movilidad y amplitud del ángulo articular.
Puede usarse por largos períodos de tiempo sin inconvenientes.
Si el animal es obeso o realiza ejercicio intenso, se recomienda una suplementación constante.
Los animales con artrosis deberán mantener suplementación prolongada.
La dosis y duración del tratamiento podrá ajustarse según el cuadro y a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN:
Estuche con 30 comprimidos.

COMPRIMIDOS **DE FÁCIL ADMINISTRACIÓN**

Pregabaliv®
John Martin

NUEVO



COMPRIMIDOS SABORIZADOS

Pregabalina **20 mg**


20 comprimidos **ranurados**

COMPOSICIÓN:
Pregabalina 20 mg.
Excipientes c.s.p. 250 mg.

INDICACIONES:
Se utiliza para tratar el dolor crónico, especialmente neuropático, en condiciones como hernias de disco, malformación tipo Chiari, siringomielia, dolor posoperatorio crónico, trauma en nervios periféricos, tumores de vaina, dolor radicular, trastornos con alodinia, enfermedades articulares crónicas, neuralgias y dolor oncológico. Como analgésico perioperatorio en terapias multimodales, puede reducir la dosis de opioides. También es útil como terapia adyuvante en convulsiones refractarias o parciales complejas y para reducir signos de ansiedad en felinos durante el transporte y manipulación.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
El producto se administra por vía oral.
Se puede administrar en forma simultánea con el alimento.
Dolor crónico:
Felinos: 1-5 mg/kg. Iniciar con dosis de administración más bajas y aumentar gradualmente hasta la dosis objetivo. Cada 12 horas.
Antiepiléptico (adyuvante):
Felinos: 1-2 mg/kg. Cada 12 horas.
Para disminuir el estrés y ansiedad en felinos asociado con el transporte y manipulación durante la consulta veterinaria: 5-10 mg/kg PO como única dosis, al menos 90 minutos antes del evento.
La duración del tratamiento queda a criterio del Profesional Veterinario actuante.

PRESENTACIÓN:
Estuche conteniendo 2 blísters de 10 comprimidos cada uno.



Ansiolítico, ideal para **disminuir los signos de ansiedad y miedo asociados con el transporte y manipulación** en el consultorio veterinario.


John
Martin®