sulfato de Atropina® inyectable

John Martin



Sulfato de Atropina 1 mg/ml

50 ml

Una herramienta de amplia aplicación en medicina veterinaria.

La **atropina** es un antagonista muscarínico que **bloquea la acción de la acetilcolina** e **inhibe los efectos del sistema nervioso parasimpático**.
Su actividad farmacológica permite su utilización en distintos escenarios clínicos, desde protocolos anestésicos y procedimientos quirúrgicos hasta el manejo de intoxicaciones colinérgicas y espasmos gastrointestinales o urinarios.
Sus múltiples aplicaciones clínicas la convierten en una molécula de **uso frecuente tanto en la práctica diaria como en situaciones de urgencia y emergencia**.

Ventajas

- **Versatilidad de uso** en diferentes escenarios clínicos.
- **Rápida acción**.
- Por su concentración, **favorece una dosificación más precisa** en pacientes de talla pequeña.
- Administración **SC, IM o EV**, según necesidad clínica.

Premedicación en cirugías:

- Evita la salivación excesiva y disminuye el moco bronquial.
- Evita el reflejo vago-vagal por manipulación de vísceras abdominales.
- Evita efectos bradicardizantes de algunos anestésicos.

En la intoxicación por organofosforados, carbamatos o agentes colinérgicos:

- Tratamiento de elección para el control de los signos muscarínicos.

Como antiespasmódico:

- Ayuda a relajar la musculatura lisa del tracto gastrointestinal y urinario, contribuyendo al alivio de espasmos y cólicos.

Dosis y administración

En premedicación quirúrgica:
0,04 mg/kg (0,4 ml/10 kg) IM o EV.

Como antiespasmódico:
0,04 mg/kg (0,4 ml/10 kg) SC, IM o EV, cada 6 - 8 horas.

En la intoxicación por organofosforados o carbamatos:
0,2 a 0,5 mg/kg (2 a 5 ml/10 kg) SC, IM o EV.

John Martin®

Laboratoriojohnmartin