Ranitidina

John Martin

gotas

SALUD GÁSTRICA

- ✓ **Máxima eficacia para el tratamiento de la acidez gástrica, gastritis, ulcera gástrica o duodenal y esofagitis.**
- ✓ **Ideal para caninos y felinos de talla pequeña.**
- ✓ **Fácil de administrar en tratamientos prolongados.**



¿Cómo actúa la ranitidina?

La ranitidina actúa inhibiendo los **receptores histaminérgicos H_2** de las células parietales del estómago, reduciendo la producción de ácido gástrico tanto en condiciones basales, como cuando es estimulada por alimento, aminoácidos, gastrina, histamina o insulina.
Con la disminución de la producción de jugo gástrico se reduce la cantidad de pepsina secretada.

La ranitidina posee una buena biodisponibilidad por vía oral. Sólo entre un **10%** y **19%** de la droga circulante se une a las proteínas plasmáticas.

Se metaboliza en el hígado a metabolitos inactivos, y se excreta en orina por mecanismos de filtración glomerular y secreción tubular.

JOHN MARTIN SRL
info@john-martin.com.ar
john-martin.com.ar

Laboratoriojohnmartin

John Martin®

1 • Esofagitis.

2 • Úlcera duodenal.
• Reflujo gastroduodenal.

3 • Gastritis.
• Acidez gástrica.
• Úlcera gástrica.
• Gastrinomas secretorios y mastocitomas.



¿Qué es la gastritis?

La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica que afecta tanto a caninos como felinos de cualquier edad. Esta enfermedad está en gran medida subestimada en la práctica clínica.

¿Cuál es el origen?

La gastritis puede tener diversos desencadenantes:
- Uso de medicamentos (como aines y otros fármacos).
- Reflujo biliar.
- Estrés.
- Insuficiencia renal.
- Consumo de sustancias tóxicas.
- Infecciones.
- Neoplasias.

¿Cómo reconocerla?

- La sintomatología clínica es poco expresiva.
- Puede presentar dolor moderado a la palpación de la región epigástrica.
- El síntoma más importante es el vómito.
- Los animales pueden presentar vómito de manera intermitente.
- Suele haber pérdida de peso progresiva, disminución de la ingesta, y en algunos casos apetito caprichoso.

✓ Ante **síntomas de acidez estomacal** como lamer paredes, náuseas y dolor, alivia y contrarresta en forma eficiente el exceso de ácido controlando el pH gástrico.

✓ **Gastritis**, **acidez gástrica**. **Esofagitis** por reflujo. **Úlcera gástrica** y/o **úlcera duodenal**. **Gastrinomas**.

✓ La **hiperazotemia** suele cursar con gastritis comprometiéndose la mucosa del estómago, generando molestia y muchas veces intolerancia a la medicación oral. Es aquí donde la ranitidina protege a la mucosa y evita el daño mejorando el disconfort y la tolerancia oral.

✓ Conjuntamente con antibióticos, antiinflamatorios esteroides y no esteroides, para **proteger la mucosa gástrica**.



GOTAS SABORIZADAS

Ranitidina chorhidrato 10 mg/ml

30 ml

25 GOTAS

=10 mg **=1 ml**

ESCANEA EL CÓDIGO PARA OBTENER LA **TABLA DOSIFICADORA**