Silihepatic®

COMPLEMENTO DIETARIO - HEPATOPROTECTOR

COMPOSICIÓN

Silibina, complejo fosfolipídico*	70 mg
SAMe (S-Adenosil-L-Metionina, disulfato tosilato)	50 mg
DL-Metionina	150 mg
L(+) -Colina bitartrato	10 mg
Vitamina E acetato	5 mg
Excipientes c.s.p.	1000 mg

*Corresponde a 21 mg de Silibina por comprimido.

30
COMPRIMIDOS BIRRANURADOS SABORIZADOS



CLASIFICACIÓN:
Complemento dietario.

FORMA FARMACÉUTICA:
Comprimidos birranurados saborizados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

ESPECIES DE DESTINO:
Caninos y felinos.

Silihepatic es un hepatoprotector con una moderna y eficaz combinación de activos pensada para proteger y favorecer el reestablecimiento de las funciones del hígado, conservando su fisiología normal.
La silibina es el componente más abundante y bioactivo presente en la silimarina, un extracto del fruto del cardo mariano que protege a la célula hepática manteniendo su salud y sosteniendo un balance oxidativo saludable. Es antioxidante, favorece la captación de

radicales libres. También proteje la célula hepática de la inflamación y la citotoxicidad de distintas sustancias neutralizando toxinas y aumentando el contenido del glutatión hepático.
La DL-Metionina es un aminoácido esencial que participa en el metabolismo hepático corrigiendo la degeneración grasa y aportando sustrato para la producción de cisteína. El SAMe o S-Adenosil Metionina es una sustancia presente en todas las células corporales. En el hígado cobra suma importancia porque participa en la formación de glutatión, sustancia fundamental en la detoxificación de moléculas nocivas. El glutatión protege los hepatocitos del deterioro y la muerte celular. Colabora con la regeneración celular y reparación hepática.
El aporte de SAMe resulta además neuroprotector, conservando la salud cerebral y mejorando las funciones cognitivas.
La colina es el principal componente de los ácidos biliares. Es el sustrato para la formación de la fosfatidilcolina, principal fosfolípido del organismo y fuente de energía en toda la actividad metabólica mitocondrial. También interviene en la generación de acetilcolina, un importante neurotransmisor.
La vitamina E aporta una función antioxidante y protege la membrana celular del hepatocito, impidiendo sobre ella la acción de la peroxidasa.

INDICACIONES:
Complemento dietario hepatoprotector. También actúa como colagogo, colerético y favorecedor del metabolismo hepático.
Como complemento en las hepatitis agudas o crónicas y trastornos hepáticos generales.
Para la prevención del hígado graso.
También es útil como suplemento de apoyo en la colangiohepatitis y cuando se observan vómitos de origen hepático.
Para proteger el hígado en las intoxicaciones agudas y crónica de cualquier origen y cuando se administra medicación antiepiléptica, quimioterápica, antimicótica oral u otras drogas hepatotóxicas.
Puede utilizarse además como complemento en el tratamiento del Síndrome de Disfunción Cognitiva.

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN:

Los comprimidos saborizados se administran por vía oral de preferencia con el estómago vacío y al menos 1 hora antes de la comida.

Dosis recomendada:

Perros: 1 comprimido cada 10 kg/día.

Gatos: 2-5 kg: ¼ comprimido /día. 5 kg o más: ½ comprimido /día.

La dosis a administrar podrá ajustarse según el caso individual, si fuera necesario y a criterio del veterinario actuante. Considerar que un aumento excesivo de la cantidad de metionina administrada puede resultar en acidificación urinaria.

La duración del tratamiento será de 10 días como mínimo. En la utilización por períodos prolongados la cantidad a administrar podrá reducirse a la mitad como dosis de mantenimiento.

EFECTOS ADVERSOS Y CONTRAINDICACIONES:

Los efectos adversos son casi inexistentes. Muy ocasionalmente puede aparecer algún trastorno gastrointestinal como vómito o diarrea.

No administrar en caso de alergias conocidas a algunos de los componentes.

No se recomienda su uso en hembras en gestación o periodo de lactancia.

No se recomienda su administración en gatos menores de 6 meses.

En caso de animales con antecedentes de cálculos de oxalato o uratos el uso prolongado debe ser monitoreado.

Evitar, en lo posible, la combinación con warfarina, antivirales, diazepam, opioides y amitriptilina.

En caso de aparición de efectos adversos por la asociación de drogas se deberá adecuar la dosis.

ADVERTENCIAS:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-3330160 (Argentina).

NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

PRESENTACIÓN:
Envase conteniendo 3 blísters de 10 comprimidos.

CONTENIDO NETO:
30 comprimidos.

CONSERVACIÓN:
Conservar en su envase original entre 15° y 25° C, al abrigo de la luz y la humedad.
No almacenar por encima de 25°C.

VENTA SIN RECETA en locales con asesoramiento profesional veterinario.

Uso Veterinario.
Industria Argentina.

john-martin.com.ar

3758.1

JOHN MARTIN S.R.L.
Timoteo Gordillo 2460 (C1440EEX)
CABA, Argentina.
Elaborado por LABCECIL S.R.L.
para JOHN MARTIN S.R.L.

D.T. Laura B. Omodeo
Farm. M. Nº 9135
SENASA Cert. N°: 23-075
Est. Elab. Habilitado N° 8473